



Infobrochure

Colpo Cysto
Defaecografie

Inhoud

Inleiding	2
Wat is een colpo cysto defaecografie of CCD?	2
Vorbereiding van het onderzoek	3
Verloop van het onderzoek	3
Nazorg	4

Colpo Cysto Defaecografie

Inleiding

Beste patiënt

Welkom op de dienst Radiologie van het AZ Sint-Jan.

U bent hier omdat u bent doorverwezen voor een onderzoek van de bekkenbodemspieren (colpo cysto defaecografie).

In deze brochure geven wij graag wat uitleg over het onderzoek.

Wat is een colpo cysto defaecografie of CCD?

Met dit onderzoek wordt de dunne darm beoordeeld, alsook de functionaliteit van de bekkenbodemspieren.

Dit onderzoek wordt voorgeschreven ikv urinaire en stoelgangproblemen. Met een CCD wordt de functionaliteit van de bekkenbodemspieren beoordeeld. Om dit te kunnen doen worden zowel dundarm, rectum, blaas als vagina met contraststof gevuld.

Vorbereiding van het onderzoek

Het is belangrijk om **nuchter** naar het onderzoek te komen.

We starten het onderzoek met een overzichtsfoto van de buik.

Om de dunne darm te beoordelen moet u 2 à 3 bekers verdunde contrast drinken, deze contraststof heeft tijd nodig om zich over de volledige dundarm te verdelen, daarom moet u een uur in de wachtzaal wachten.

Breng dus zeker iets mee om de tijd te verdrijven.

Verloop van het onderzoek

Na een uur wordt u binnengevraagd in de onderzoekszaal.

Door middel van een röntgenopname controleren we als de kleurstof zich goed verspreid heeft in de volledige dundarm.

Wanneer dit het geval is, plaatsen we een sonde waarmee we de blaas vullen met contrastvloeistof.

Daarna vullen we ook de vagina en het rectum met contrast.

Tijdens het onderzoek zullen we röntgenopnames maken.

Er zal u gevraagd worden om verschillende oefeningen uit te voeren (ontspannen, billen samenknijpen en persen).

Ondertussen worden röntgenopnamen gemaakt.

Daarna doen we hetzelfde in zittende houding waarna u ook mag plassen en stoelgang maken.

De verpleegkundige en/of arts blijven bij u tijdens het onderzoek. U kan met eventuele vragen bij hun terecht.

De totale duur van het onderzoek is ongeveer 1.30u

Nazorg

Na het onderzoek mag u eten en drinken.

Er kan eventueel wat verlies van contraststof zijn vaginaal.

Het is goed om een maandverband mee te brengen naar het onderzoek.

Er wordt geadviseerd om na het onderzoek veel water te drinken. Dit om het contrastvloeistof uit de blaas en darmen te verwijderen. Het peroraal gedronken contrast kan eventueel wat constipatie geven.

De resultaten worden naar de aanvragende geneesheer verstuurd.

Contactgegevens

Dienst Radiologie - Medische beeldvorming

Route 120

t: 050 45 21 01

e: RX.Afspraken@azsintjan.be